TRENTE-TROISIÈME ANNÉE, - FÉVRIER 1870.

I. TRAVAUX INÉDITS.

DESCRIPTION de quelques animaux nouveaux, découverts à Madagascar, en novembre 1869, par M. Alfred Gran-DIDIER.

1º CHIROGALUS CROSSLEYI. Parties supérieures roussâtres, surtout sur la tête, parties inférieures blanchâtres. Tête énorme, arrondie. Cercle noir autour des yeux. L'intérieur des oreilles est recouvert de poils brun foncé, et leur sommet est bordé de noir. Queue courte et très-fournie. Oreilles petites. — Longueur du corps, 20 cent.; de la queue, 12 cent.; des membres antérieurs, 7 cent.; des membres postérieurs, 10 cent.; des oreilles, 1 cent. Hab. forêts est d'Antsianak.

2º VESPERTILIO SYLVICOLA, d'un roux marron; abdomen gris foncé. Queue entièrement enveloppée dans la membrane interfémorale.

Corps et queue, 72 mill.; queue seule, 34 mill.; envergure, 21 cent. Hab. forêts d'Ambaravaranyatou.

3° NYCTINOMUS UNICOLOR, d'un brun assez foncé, qui est à peine plus clair sous l'abdomen. Queue libre dans plus de la moitié de son étendue. Oreilles fort grandes, qui sont réunies sur le front par une petite membrane. Lèvres épaisses et larges.

Longueur totale, 13 cent.; de la queue, 42 cent.; de la partie de la queue enveloppée dans la membrane interfémorale, 15 mill.; envergure, 41 cent. 1/2.

2º SÉRIE, T. XXII. Année 1870.

ORYZORICTES (gen. nov.), de l'ordre des insectivores. Incisives, 3/3; canines, 1/1; molaires, 6/6. Museau terminé en trompe, à l'extrémité de laquelle sont percées de petites narines. Yeux très-petits. Oreilles arrondies, moyennes. Plantigrade; les pattes antérieures, à 4 doigts, dont 3 armés d'ongles recourbés très-robustes; les postérieures, à 5 doigts.

4° ORYZORICTES HOVA, d'un gris brun. Sommet de la trompe complétement dénudé et séparé, de chaque côté, des lèvres qui sont couvertes de petits poils, par un sillon longitudinal. Queue assez courte, couverte, à sa base, de poils assez longs, presque nue dans les deux derniers tiers, et montrant des anneaux imbriqués.

Nom malgache, valavou-fontsi, à cause des dégâts énormes aux récoltes de riz, en creusant sous terre, et en déracinant les jeunes plants. Hab. Ankaye et Antsianak.

5° BERNIERIA CROSSLEYI. ¿Parties supérieures d'un roux olivâtre, front gris. Un trait noir, partant de l'angle du bec, passe au-dessus des yeux, et va, en s'élargissant un peu, jusqu'aux côtés du cou, ainsi que le trait blanc qui passe sous les yeux. Cou et gorge noirâtres. Poitrine grise, abdomen blanchâtre.

Q Olivâtre. Un trait fin gris surmonte les yeux; en arrière, il devient noir; sous les yeux, il est blanc. Cou et menton blancs, gorge d'un gris olivâtre, abdomen d'un blanc olivâtre.

Longueur totale, 15 cent.; de l'aile, 72 mill.; de la queue, 55 mill.; du bec, 24 mill.; du tarse, 22 mill.; du doigt médian, 18 mill.; du pouce, 13, avec l'ongle.

Deux de ces animaux, le *Chirogalus* et le *Bernieria*, ont été collectionnés par M. Crossley, voyageur qui parcourt certaines parties de Madagascar depuis deux ans. C'est à son obligeance que je dois de pouvoir les décrire.